

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

GASTROVAL geriamieji lašai (tirpalas)

Valerijon tinktūra, karščiavimas, pipirmėčių lapų tinktūra, standartizuota šunvyšnių lapų tinktūra

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėliau gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės vaistininko.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės gydytoju arba vaistininku. Žr. 4 skyrių.
- Jeigu per 7 dienas Jūs savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės gydytoju.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra GASTROVAL ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant GASTROVAL
3. Kaip vartoti GASTROVAL
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti GASTROVAL
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra GASTROVAL ir kam jis vartojamas

Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas apetitui bei virškinamojo trakto veiklai gerinti, žarnyno ir tulžies takų spazmams lengvinti bei vidurių užkietėjimui mažinti.

Jeigu per 7 dienas Jūs savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės gydytoju.

2. Kas žinotina prieš vartojant GASTROVAL

GASTROVAL vartoti negalima:

- jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms,
- jeigu padidėjęs akispūslis.

spėjimai ir atsargumo priemonės:

- vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims.
- jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 1 savaitę simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.
- jei blogas tulžies takų praeinamumas, yra sunki kepenų liga, sutrikęs šlapinimasis, ypač dėl priešinės liaukos hipertrofijos, vaisto geriau nevartoti.
- pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradami vartoti Gastroval.

Vaikams ir paaugliams

Vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims, nes nėra atlikta atitinkamų saugumo tyrimų.

Kiti vaistai ir GASTROVAL

Vartojant kartu su amantadinu, chinidinu, tricikliais antidepresantais, neuroleptikais, anticholinerginis poveikis didesnis. Metoklopramidą mažina šunvėšniškų alkaloidų poveikį virškinamajam traktui. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitą vaistą arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėšia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėšia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Paskutiniuosis nėštumo mėnesius ir žindymo laikotarpiu vaisto vartoti negalima. Poveikis vaisingumui nežinomas.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Vartojant rekomenduojamą dozę, neigiamo vaisto poveikio gėbėjimui vairuoti automobilį ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus nepastebėta, tačiau nuo didesnės dozės gali sutrikti gėbėjimas reaguoti.

GASTROVAL sudėtyje yra etanolio

Šio vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 tūrio % etanolio (alkoholio), t.y. 224 mg dozėje (atitinka 4,4 ml alaus ir 1,83 ml vyno). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.

Būtina atsizvelgti nėšiosioms, žindymuis, vaikams ir didelės rizikos grupėms (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

3. Kaip vartoti GASTROVAL

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės gydytojo arba vaistininko.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Dozavimas

Suaugusiems

Gerti 30 min. prieš valgį 2 – 3 kartus per dieną po 10 – 20 lašų.

Vartoti ilgiau negu 1 savaitę galima tik pasitarus su gydytoju.

Vartojimas vaikams

Vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims, nes nėra atlikta atitinkamų saugumo tyrimų.

Pamiršus pavartoti GASTROVAL

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės gydytojo arba vaistininko.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gydymo dozė nepageidaujamo poveikio dažniausiai nesukelia. Galimi alerginiai ar jė panašios reakcijos (dilgėlinės, niežėjimo) pavieniai atvejai. Gali džiūti burna, dažniau susitraukinti širdis, sutrikti šlapinimasis, pablogėti regėjimas.

Jei pasireiškia kiti, anksčiau nepaminėti šalutiniai reiškiniai, reikia pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, skaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainę www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel.: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti GASTROVAL

Šis vaistas laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

Ant buteliuko etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodytos mėnesio dienos.

Vaistą negalima išmesti kanalizacijai arba su buitiniams atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

GASTROVAL sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra valerijonų tinktūra, karščiavėlių žolės tinktūra, pipirmėčių lapų tinktūra ir standartizuota šunvyšnių lapų tinktūra.
1 ml geriamajam lašui yra 0,4 ml *Valeriana officinalis* L., radix (valerijonų šaknų) tinktūros (1:5, ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis), 0,3 ml *Artemisia absinthium* L., herba (karščiavėlių žolės) tinktūros (1:5, ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis), 0,2 ml *Mentha x piperita* L., folium (pipirmėčių lapų) tinktūros (1:20, ekstrahentas 90 % (V/V) etanolis), 0,1 ml *Atropa belladonna* L., folium (šunvyšnių lapų) standartizuotos tinktūros (1:10, ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis).
- Pagalbini medžiagų nėra.

GASTROVAL išvaizda ir kiekis pakuotėje:

Gelsvai žalsvai rudos spalvos skystis.

Kartono dėžutėje yra vienas buteliukas su lašintuvu, kuriame yra 25 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

UAB „Valentis“

Molėtų pl. 11

LT-08409 Vilnius

Tel.: +370 5 2701225

Faksas: +370 5 2701223

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės vietinį rinkodaros teisės turėtoją atstovą:

UAB „Valentis“

Molėtų pl. 11

LT-08409 Vilnius

Tel.: +370 5 2701225

Faksas: +370 5 2701223

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2014-11-24

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.