

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

PERTUSINAS forte sirupas Čiobrelių skystasis ekstraktas

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Sirupo PERTUSINAS forte galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 7 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra sirupas PERTUSINAS forte ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant sirupą PERTUSINAS forte
3. Kaip vartoti sirupą PERTUSINAS forte
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti sirupą PERTUSINAS forte
6. Kita informacija

1. KAS YRA SIRUPAS PERTUSINAS FORTE IR KAM JIS VARTOJAMAS

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, vartojamas peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė.

Tai tradicinis augalinis vaistinis preparatas, vartojamas pagal nurodytas indikacijas, išimtinai remiantis ilgalaikėmis vartojimo tradicijomis.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SIRUPĄ PERTUSINAS FORTE

Sirupo PERTUSINAS forte vartoti negalima:

- jeigu yra padidėjęs jautrumas čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) šeimos (*Lamiaceae, s. Labiatae*) augalams.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

- vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, kadangi trūksta tyrimų duomenų;
- jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingi skrepliai, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nenustatyta.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Saugumo tyrimų nėščiosioms ar žindyvėms nėra atlikta. Jei trūksta duomenų, vaistinio preparato nėščiosioms ir žindyvėms vartoti nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Dėl vaisto poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nebuvo atlikta jokių tyrimų.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines sirupo PERTUSINAS forte medžiagas

Šio vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 tūrio % etanolio (alkoholio), t.y. iki 0,4 g dozėje (5 ml), tai atitinka 8 ml alaus, 3,4 ml vyno. Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.

Į tai būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz. sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

Dozėje (5 ml), yra 4,6 g cukraus (sacharozės).

Cukriniu diabetu sergantiems pacientams būtina į tai atsižvelgti.

Jei gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI SIRUPĄ PERTUSINAS FORTE

Vartoti per burną.

Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams gerti 3 - 5 kartus per parą po vieną arbatinį šaukštelį (5 ml).

Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams.

Jei vartojant šio vaistinio preparato simptomai neišnyksta per savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

PERTUSINAS forte, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Buvo pastebėta padidinto jautrumo reakcijos atvejų (tarp jų vienas anafilaksinio šoko ir vienas Kvinkės edemos atvejis) bei virškinimo sutrikimų. Dažnumas nežinomas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI SIRUPĄ PERTUSINAS FORTE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Buteliuką laikyti dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Buteliuką laikyti sandarų.

Ant buteliuko etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, sirupo PERTUSINAS forte vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Sirupo PERTUSINAS forte sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra čiobrelių skystasis ekstraktas. 1 ml tirpalo yra 307,5 mg *Thymus vulgaris* L. ir/ar *Thymus zygis* L., herba (čiobrelių žolės), skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas: 30 % (V/V) etanolis.
- Pagalbinė medžiaga: cukraus sirupas.

Sirupo PERTUSINAS forte išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tamsiai rudos spalvos, aromatinio kvapo, saldaus skonio sirupas.

Kartono dėžutėje yra vienas buteliukas, kuriame yra 100 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-06-15

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>