

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Miramile burnos gleivinės purškalas

Miros sakų tinktūra
Vaistinių ramunių žiedų skystasis ekstraktas
Eukaliptų lapų tinktūra
Šalavijų lapų tinktūra

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Miramile galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Miramile ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Miramile
3. Kaip vartoti Miramile
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Miramile
6. Kita informacija

1. KAS YRA MIRAMILE IR KAM JIS VARTOJAMAS

Miramile purškalas – tai sudėtinis išoriškai vartojamas preparatas, kurio sudėtyje yra miros tinktūros, ramunių skystojo ekstrakto, eukaliptų ir šalavijų tinktūrų.

Veikia dezinfekuojančiai sergant įprastomis burnos ir gerklės ertmės infekcijomis arba vartojant vaistą jų profilaktikai, slopina infekcijos sukeltą gleivinių pabrinkimą, dezodoruoja burnos ertmę.

Vartojamas kai yra burnos ir gerklės gleivinių uždegimai (tonzilitas, faringitas, laringitas, stomatitas, gingivitas), taip pat burnos ir gerklės infekcijų profilaktikai, burnos higienai.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MIRAMILE

Miramile vartoti negalima:

- jeigu yra alergija vaistinėms ramunėms arba graižaziedžių šeimos augalams;
- kūdikiams ir mažiems vaikams.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

- saugoti, kad vaisto nepatektų į akis;
- vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 45 % (V/V) etanolio.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Apie sąveiką su kitais vaistais duomenų nėra.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nėra duomenų, kad vaisto sudėtyje esančios medžiagos neigiamai veiktų vaisių arba žindomą kūdikį.

Nėštumo ir žindymo laikotarpiu moterys vaistą gali vartoti tik gydytojui paskyrus.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepasireiškia.

3. KAIP VARTOTI MIRAMILE

Miramile visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartoti į burną ir ryklę. Reikia purkšti 4 – 6 kartus per dieną po kelias vienu purkštuvo galvutės paspaudimu išpurškiamas dozes. Purškimo metu patariama sulaikyti kvėpavimą.

Pradedant vartoti vaistą iš naujos pakuotės, reikia nuimti apsauginį dangtelį ir uždėti pakuotėje pridėtą purkštuvo galvutę su antgaliu. Spustelėti kelis kartus. Saugoti, kad vaisto nepatektų į akis.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Miramile, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Graižaziedžiams alergiškiems žmonėms gali sukelti alerginių reakcijų.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI MIRAMILE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ant buteliuko etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Miramile vartoti negalima.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

MIRAMILE sudėtis

- Veikliosios medžiagos: 1 ml preparato yra 0,1 ml miros sakų tinktūros 1:5 (ekstrahentas 90 % (V/V) etanolis), 0,35 ml vaistinių ramunių žiedų skystojo ekstrakto 1:1 (ekstrahentas 50 % (V/V) etanolis), 0,05 ml eukaliptų lapų tinktūros 1:5 (ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis), 0,3 ml šalavijų lapų tinktūros 1:5 (ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis).
- Pagalbinė medžiaga - glicerolis.

Miramile išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tamsaus stiklo buteliukas, kuriame yra 50 ml preparato, užsuktas dangteliu su dozuojamuoju siurbliuku ir pridėtu purkštuku su antgaliu.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

UAB „Valentis“

Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-11-20

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>