

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Kamparas Valentis 100 mg/ml odos tirpalas
 raceminis kamparas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
- Jeigu per 5 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Kamparas Valentis ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Kamparą Valentis
3. Kaip vartoti Kamparą Valentis
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Kamparą Valentis
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Kamparas Valentis ir kam jis vartojamas

Kamparas gaunamas iš kamparmedžio arba sintetiniu būdu iš balteglės sakų ir terpentino. Vartojamas ant odos kamparas dirgina odoje esančias juntamųjų nervų galūnes, todėl išsiplečia odos ir po ja esančių audinių kraujagyslės, toje vietoje gerėja kraujotaka ir medžiagų apykaita.

Vaisto vartojama vietiniam skausmo malšinimui esant raumenų, sausgyslių bei sąnarių uždegimui.

Vaisto netinka vartoti ūminiu ligos laikotarpiu. Jeigu per 5 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

2. Kas žinotina prieš vartojant Kamparą Valentis
Kamparo Valentis odos tirpalo vartoti draudžiama:

- jeigu yra alergija kamparui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Išpėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Kamparą Valentis. Vaisto negalima vartoti ant atvirų žaizdų, egzemos, pažeistos, šlapiuojančios, suskeldėjusios odos, šalia akių bei ant gleivinių; Kad būtų išvengta toksinio poveikio, juo negalima tepti didelių odos plotų, patep-

tos vietos uždenkti orui nepralaidžiais tvarsčiais.

Kamparas Valentis sudėtyje yra etanolio Kiekviename šio vaisto ml yra 552 mg alkoholio (etanolio) (70 % V/V). Ant pažeistos odos plotų etanolis gali sukelti deginimo pojūtį.

Pajutus stiprų dirginimą arba skausmą, odą reikia nuplauti šiltu vandeniu su muilu ir vaisto toliau nevartoti.

Vaistas gali didinti kitų kartu lokaliai vartojamų vaistinių preparatų prasiskverbimą per odą.

Vaikams

Kamparo Valentis nerekomenduojama vartoti vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka.

Kiti vaistai ir Kamparas Valentis

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nors duomenų apie žalingą preparato poveikį vaisiui nėra, jo nėščioms moterims ir žindyvėms galima vartoti tik būtinu atveju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kamparas Valentis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

3. Kaip vartoti Kamparą Valentis

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo būdas

Vartoti ant odos.

Suaugusiesiems

Skaudamą vietą 2-3 kartus per dieną gerai įtrinti 10 – 15 ml odos tirpalo ir pamasažuoti.

Vartojimas vaikams

Kamparo Valentis nerekomenduojama vartoti vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka.

Ką daryti pavartojus per didelę Kamparo Valentis dozę

Dėl perdozavimo gali būti sudirginta oda.

Neteisingai pavartojus

Preparato išgėrus, gali atsirasti skrandžio ir žarnyno sutrikimai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas. Gydytas simptomais.

Toksiniam išgerto kamparo poveikiui itin jautrūs vaikai. Jei Jūs ar Jūsų vaikas atsitiktinai išgėrė Kamparo Valentis, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją, kuris paskirs reikiamą gydymą. Negalima sukelti vėmimo.

Pamiršus pavartoti Kamparo Valentis

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Kamparo Valentis

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Labai reti šalutinio poveikio reiškiniai gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000 asmenų:

Imuninės sistemos sutrikimai. Padidėjusio jautrumo reakcijos.

Šalutinio poveikio reiškiniai, kurių dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

Odos ir poodinio audinio sutrikimai. Odos dirginimas; kontaktinė egzema.

Nervų sistemos sutrikimai. Centrinės nervų sistemos sujaudinimo simptomai, traukulių padaržėjimas ir pasunkėjimas epilepsija sergantiems ligoniams (dėl vaisto patekimo į kraują vartojant ilgai arba juo tepant didelį odos plotą).

Širdies sutrikimai. Kraujo spaudimo padidėjimas, širdies ritmo sutrikimas (dėl vaisto patekimo į kraują vartojant ilgai arba juo tepant didelį odos plotą).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite pateikti šiais būdais: tiesiogiai užpildant formą internetu Valsstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv> arba užpildant Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (INR) formą, kuri skelbiama <https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba nemokamu telefonu 8 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Kamparą Valentis

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Buteliuką laikyti sandarų.

Ant etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kamparo Valentis sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra raceminis kamparas. 1 ml odos tirpalo yra 100 mg raceminio kamparo.

- Pagalbinės medžiagos yra etanolis (96 %) ir išgrynintas vanduo.

Kamparo Valentis išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kamparas Valentis odos tirpalas yra skaidrus bespalvis kamparo kvapo skystis.

Vaistas tiekiamas užsukamame stikliniame buteliuke arba plastikiniame buteliuke su lašintuvu, kuriame yra 40 ml arba 80 ml odos tirpalo. Kartono dėžutėje yra vienas buteliukas.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

UAB „Valentis“
 Molėtų pl. 11
 LT-08409 Vilnius
 Lietuva

Gamintojas

UAB „Valentis“
 Taikos pr. 102
 LT-51195 Kaunas
 Lietuva

Tel.: +370 37 452650
 Faksas: +370 37 452664

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

UAB „Valentis“
 Molėtų pl. 11
 LT-08409 Vilnius
 Tel.: +370 5 2701225
 Faksas: +370 5 2701223

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2023-03-20.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valsstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.

